

NM1 A 1 / 1 Colle Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie		Viabilità				
Superficie totale ha	13,72	Altitudine	tra 100 e 600 m	1) Assente	tracciati n.			
produttiva ha	13,51	min	505	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
tare ha	0,21	max	633	3)				
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Est	captabilità	facile			
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	G. infiammabilità	elevato			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato					
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Roverella	Cerro	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 <= 15 cm	30 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	70 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Tagli furtivi		entità	scarso	
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2108
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	156	Incremento medio mc/ha	3,5
Diametro medio cm	17,0				
<p>Note Diradata una fascia lungo la strada ed il fosso principale (superficie di circa 1 ha). Presenti: acero opalo, carpinella; albero di Giuda nel versante esposto a sud-ovest.</p>					

NM1 A 2 / 1 Valle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fust.transitoria di roverella				
Superficie totale ha	4,01	Altitudine	tra 600 e 1000 m			
produttiva ha	3,94	min	572			
tare ha	0,07	max	797			
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Ovest			
Risorse idriche	assenti	origine				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse			
			Viabilità			
			1) Assente			
			2)			
			3)			
			tracciati n.			
			<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
			captabilità			
			G. infiammabilità			
			medio			

Fustaia transitoria	a prevalenza di	Roverella	Carpino nero	Cerro	Orniello
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	uniforme	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	sotto copertura	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	630
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	160	Incremento medio mc/ha	3,4
Diametro medio cm	15,0				

Note Specie arboree: acero opalo, maggiociondolo.

NM1 A 2 / 2 Valle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	12,58	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	12,56	min	701	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
tare ha	0,02	max	867	2) Sentiero/mulat.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Roverella	Cerro	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	60 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 > 35 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2638
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	210	Incremento medio mc/ha	4,5
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note Il tratto lungo il fosso, nella parte nord-orientale, è costituito in prevalenza da cerro ed acero opalo e presenta maggiore fertilità. Specie arboree: carpinella, albero di Giuda, acero trilobo, ciavardello. Chiarie rocciose con arbusti spinosi e ginestra odorosa.</p>					

NM1 A 3 / 1 Sotto M.Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fustaia transitoria di cerro						
Superficie totale ha	2,19	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	2,19	min	755	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	846	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Fustaia transitoria	pura di	Cerro	Roverella	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	48	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	uniforme	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	sotto copertura	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	19,0	Classe provvigione	301 - 500 mc /ha	Volume totale mc	723
Altezza dominante m	23,0	Provvigione mc/ha	330	Incremento medio mc/ha	6,9
Diametro medio cm	23,0				
<p>Note In alcuni tratti si osservano disseccamenti di piante dominate (cerro e roverella). Presenza di acero opalo e di un piano dominato uniformemente distribuito costituito da: carpinella (molto pascolata), pungitopo, corniolo, rosa canina.</p>					

NM1 A 3 / 2 Sotto M.Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	8,00	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità in particella				
produttiva ha	8,00	min	798	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1107	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Cerro	Roverella	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	80 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 > 35 cm	20 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	11,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1880
Altezza dominante m	14,0	Provvigione mc/ha	235	Incremento medio mc/ha	5,0
Diametro medio cm	14,0				
<p>Note La densità si riduce oltre i 1000 m di quota. Presenza di chiarie con ginestra odorosa ed i arbusti spinosi. Specie arboree: acero opalo, farinaccio, faggio.</p>					

NM1 A 4 / 1 Valle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	21,09	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	21,09	min	855	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1065	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Roverella	Orniello	Cerro
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	4429
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	210	Incremento medio mc/ha	4,5
Diametro medio cm	16,0				
<p>Note Chiarie frequenti nella parte che costeggia il margine sud, dove in numerosi tratti prevale roverella mista ad orniello. Altre specie presenti: acero opalo, frassino ossifillo, sorbo montano. Tratto a prevalenza di cerro su piccolo ripiano situato oltre i 1000 m di quota.</p>					

NM1 A 5 / 1 Cima Casarene

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino					
Superficie totale ha	9,30	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	9,03	min	1059	1) Assente			
tare ha	0,27	max	1197	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	medio			

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Cerro	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	41 - 50
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	60 %	Avviamento a fustaia
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.1 tra 15 e 35 cm
				90 %
				dim.2 > 35 cm
				10 %
				dim.3
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione
stato vegetativo				posizione
Danni	Assenti			entità
Altezza media m	16,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc
Altezza dominante m	20,0	Provvigione mc/ha	270	2438
Diametro medio cm	20,0			Incremento medio mc/ha
				5,7
<p>Note Diversi tratti a prevalenza di frassino ossifillo ed acero opalo. Latifoglie varie: faggio, tiglio platifillo, acero trilobo, maggiociondolo, sorbo montano. Presenza di numerose matricine capitozzate con diametri di 1-1,20 m. Chiarie pietrose occupate da arbusti spinosi.</p>				

NM1 A 5 / 2 Cima Casarene

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di roverella						
Superficie totale ha	15,50	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	13,75	min	1057	1)	Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	1,75	max	1196	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Roverella	Orniello	Cerro	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,70	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	scarsa	sp.1 Roverella	60 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	10,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2131
Altezza dominante m	13,0	Provvigione mc/ha	155	Incremento medio mc/ha	3,3
Diametro medio cm	13,0				
<p>Note Numerose aree rade e chiare estese con rocciosità elevata ed arbusti spinosi. Si incontrano alcune grandi matricine capitozzate con diametri di circa 1m. Latifoglie varie:carpino nero, acero opalo e trilobo, sorbo montano e ciavardello.</p>					

NM1 A 6 / 1 Cima Casarene

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	7,32	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	7,28	min	1070	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,04	max	1196	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Frassino ossifillo	Acero opalo	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	46	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	80 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 > 35 cm	20 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	16,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1813
Altezza dominante m	19,0	Provvigione mc/ha	249	Incremento medio mc/ha	5,4
Diametro medio cm	19,0				
<p>Note Frequenti tratti a prevalenza di frassino ossifillo e acero opalo. Altre specie presenti: tiglio platifillo, acero campestre, orniello, farinaccio, maggiociondolo. Numerose matricine capitozzate con diametri di m.1-1,2.</p>					

NM1 A 6 / 2 Cima Casarene

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Pascoli

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	1,77	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità in particella			
produttiva ha	1,76	min	1169	1) Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,01	max	1196	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 5 e 15%	Esposizione	Sud-Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Rocciosità elevata nella parte alta; prevalenza di pascolo arborato con arbusti nella parte bassa. Cotico molto rado fra cui si riconoscono bromo eretto, erba mazzolina, loietto, paleino odoroso.</p>				

NM1 A 6 / 3 Cima Casarene

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie					
Superficie totale ha	10,83	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	9,75	min	1046	1) Assente			
tare ha	1,08	max	1182	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	elevato			

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Cerro	Roverella	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	100 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2291
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	235	Incremento medio mc/ha	5,2
Diametro medio cm	17,0				
<p>Note Numerose chiarie con elevata pietrosità, alcune decisamente ampie (2000 mq.), pascolate ed occupate da arbusti spinosi. Altre specie presenti: frassino ossifillo, acero opalo, campestre e trilobo, carpino bianco, sorbo montano, fusaggine.</p>					

NM1 A 6 / 4 Cima Casarene

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Pascoli

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto					
Superficie totale ha	1,60	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità in particella			
produttiva ha	1,60	min	1087	1) Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1105	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:	Classe di età
Densità	Coeff. copertura	Avviamento a fustaia
Matricinatura (cedui) entità	sp.1 %	dim.1 %
Matr. distribuzione	sp.2 %	dim.2
		dim.3
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione	
stato vegetativo	posizione	
Danni	entità	
Altezza media m	Classe provvigione	Volume totale mc
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha	Incremento medio mc/ha
Diametro medio cm		
Note		

NM1 A 7 / 1 Stalla di Ciampani

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Core/V.Capret/Rocca Solana
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto		Viabilità in particella				
Superficie totale ha	9,15	Altitudine	tra 600 e 1000 m	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
produttiva ha	9,15	min	637	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
tare ha	0,00	max	719	3)				
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	captabilità facile				
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	G. infiammabilità elevato				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato					
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Fasce discontinue e piccoli nuclei arborati con roverella, cerro, orniello, albero di Giuda ed acero opalo. Piante residue di colture agricole abbandonate: olivo, acero trilobo e vite. Densi nuclei di rinnovazione affermata di orniello, roverella, carpiniella. Fra gli arbusti: rovi, prunus, rosa e biancospino.</p>				

NM1 A 7 / 2 Stalla di Ciampani

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Core/V.Capret/Rocca Solana
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo cespugliato				
Superficie totale ha	2,23	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità in particella			
produttiva ha	2,21	min	627	1) Camionabile <i>tracciati n.</i>			
tare ha	0,02	max	689	2) Strada forest. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>3</td><td></td></tr></table>	4	3	
4	3						
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Ovest	3) Sentiero/mulat.			
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità facile			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse					

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Piccoli nuclei di piante arboree e prevalenza di arbusti nella parte più a Sud Roverelle e cerri come essenze forestali, soliti rovi, rosa e pruni, fra gli arbusti. Cotico a bromo, erba mazzolina, coda di cane, paléo.</p>				

NM1 A 7 / 3 Stalla di Ciampani

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Core/V.Capret/Rocca Solana
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civico
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Formazione pioniera	Bosco di neoformazione	
Superficie totale ha	1,18	Altitudine	tra 600 e 1000 m
produttiva ha	1,17	min	702
tare ha	0,01	max	737
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Ovest
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato
Pascolamento	permanente		di specie diverse

Viabilità		in particella				
1)	Sentiero/mulat.	tracciati n.				
2)		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				
3)						

captabilità	facile
G. infiammabilità	elevato

Bosco di invasione	a prevalenza di	Roverella	Carpino nero	Orniello
Grado evolutivo		Età prevalente anni:		Classe di età
Densità	scarsa	Coeff. copertura	0,75	Avviamento a fustaia
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2
				dim.3
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione	
stato vegetativo			posizione	
Danni	Assenti		entità	
Altezza media m	10,0	Classe provvigione	0 - 50 mc /ha	Volume totale mc
Altezza dominante m	14,0	Provvigione mc/ha	50	Incremento medio mc/ha
Diametro medio cm	14,0			

Note Oltre alle essenze arboree principali, si rilevano anche, in maniera sporadica, acero campestre e il trilobo. Presenti due nuclei di fustaia rada di roverella con altezza media di 8 m e diametri compresi fra 15 e 20 cm. I rari ricacci al piede sono stati ripetutamente brucati formando dei "manicotti" intorno al fusto della pianta. Il corteggio di specie arbustive è sempre costituito da rovi, rosa e prunus.

NM1 A 8 / 1 Colle Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto		Viabilità in particella	
Superficie totale ha	7,87	Altitudine	tra 600 e 1000 m	tracciati n.	
produttiva ha	7,87	min	580	1) Strada forest.	
tare ha	0,00	max	703	2) Sentiero/mulat.	3
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord	3)	
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità	facile
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	medio
Pascolamento	permanente	di specie diverse			

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Arbusteto su ex coltivo a prevalenza di ginestra odorosa con rosa canina, pruno, rovo. Nuclei e piante sparse di roverella, carpinella, acero trilobo, opalo e campestre, albero di Giuda. Presenti rosacee da frutto e carpino bianco lungo il fosso. Trattati di cotico erboso poco utilizzato con felce aquilina.</p>				

NM1 A 8 / 2 Colle Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	abbeveratoio	imposto	COMPRESA
Emergenze	assenti		Pascoli

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo cespugliato				
Superficie totale ha	4,10	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità in particella			
produttiva ha	4,10	min	599	1) Strada forest. tracciati n.			
tare ha	0,00	max	691	2) Pista d'esbosco <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	3		
3							
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Ovest	3) Sentiero/mulat.			
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità facile			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità medio			
Pascolamento	permanente	di specie diverse					

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Pascolo arborato per a presenza di roverella, cerro e acero campestre. Trattati ad arbusteto nella parte alta la cui composizione prevalente è formata da rovi, rosa e prunus. Graminacee: erba mazzolina, bromo, palèo e coda di cane. Cotico molto sfruttato per la costante presenza di bovini ed equini; questi ultimi, agiscono con eccessiva intensità di brucamento.</p>				

NM1 A 8 / 3 Colle Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. stor. Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fust.trans. cerro e roverella						
Superficie totale ha	5,51	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	5,51	min	587	1) Strada forest.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	671	2) Pista d'esbosco	<table border="1"><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	3		
3								
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Fustaia transitoria	mista di	Cerro	Roverella	Carpino nero	Orniello
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	uniforme	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	sotto copertura	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1168
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	212	Incremento medio mc/ha	4,5
Diametro medio cm	15,0				

Note Alcuni tratti radi con arbusti spinosi. Presenti acero opalo e maggiociondolo.

NM1 A 8 / 4 Colle Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invec.cerro e roverella	
Superficie totale ha	9,48	Altitudine	tra 600 e 1000 m
produttiva ha	9,36	min	624
tare ha	0,12	max	764
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Est
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato
Pascolamento	permanente		di specie diverse

Viabilità		in particella			
1)	Pista d'esbosco	tracciati n.			
2)	Sentiero/mulat.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
3)					

captabilità		facile
G. infiammabilità		medio

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Cerro	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	46	Classe di età 41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	50 %	dim.1 <= 15 cm 30 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Cerro	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm 70 %
				dim.3
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione
stato vegetativo				posizione
Danni	Assenti			entità
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc 1750
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	187	Incremento medio mc/ha 4,1
Diametro medio cm	16,0			

Note Numerose chiare e tratti radi nella parte inferiore dell'UdS. Molto pascolata. Latifoglie varie: carpino nero, orniello, carpinella, acero opalo. Lungo la pista di esbosco e lungo il fosso fascia rada avviata all'alto fusto.

NM1 A 8 / 5 Colle Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civico
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Formazione pioniera	Bosco di neoformazione	
Superficie totale ha	2,33	Altitudine	tra 600 e 1000 m
produttiva ha	2,31	min	717
tare ha	0,02	max	775
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato
Pascolamento	permanente		di specie diverse

Viabilità	in particella			
1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
3)				

Bosco di invasione	misto di	Roverella	Cerro	Acero campestre	Orniello
Grado evolutivo		Età prevalente anni:		Classe di età	Indeterm.
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,70	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	9,0	Classe provvigione	0 - 50 mc /ha	Volume totale mc	116
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	50	Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note Alberatura dislocata a piccoli nuclei. Densi gruppi di arbusti, con il solito corteggio di rovi, rosa e prunus, i localizzati soprattutto al confine con la particella 8/4.</p>					

NM1 A 9 / 1 Sopra C.Ripaccioli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.		Fust.trans. cerro e roverella					
Superficie totale ha	21,23	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità in particella				
produttiva ha	21,12	min	571	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,11	max	770	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Fustaia transitoria	mista di	Roverella	Cerro	Carpino nero	Orniello
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	uniforme	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	sotto copertura	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	6252
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	296	Incremento medio mc/ha	6,3
Diametro medio cm	17,0				

Note La parte meridionale della UdS presenta densità e sviluppo inferiori. Tratti non avviati ad alto fusto lungo il sentiero, nella parte settentrionale. Altre specie presenti: acero opalo e trilobo, carpinella, maggiociondolo, ciavardello. Alcune chiarie con rosa canina, biancospino, ginestra.

NM1 A 10 / 1 Sotto Colle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino				
Superficie totale ha	5,82	Altitudine	tra 600 e 1000 m			
produttiva ha	5,78	min	762			
tare ha	0,04	max	864			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest			
Risorse idriche	assenti	origine				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse			
		Viabilità				
		1) Assente	tracciati n.			
		2)	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
		3)				
		captabilità				
		G. infiammabilità	medio			

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Cerro	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età
				41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 <= 15 cm
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm
				dim.3
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione
stato vegetativo				posizione
Danni	Assenti			entità
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc
				1191
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	206	Incremento medio mc/ha
				4,4
Diametro medio cm	16,0			
<p>Note Più rada e rocciosa la fascia a contatto con la UdS 10/2. Latifoglie varie: acero opalo, carpinella, frassino i ossifillo, nocciolo e roverella.</p>				

NM1 A 10 / 2 Sotto Colle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di roverella						
Superficie totale ha	12,69	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	12,60	min	745	1)	Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,09	max	863	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Roverella	Carpino nero	Cerro	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	70 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 > 35 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2671
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	212	Incremento medio mc/ha	4,5
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note Zone rade e chiarie nella parte centrale (esposizione ovest), con tratti rocciosi ed arbusteti a rosa canina e biancospino. Altre specie arboree presenti: acero opalo e trilobo, carpinella, albero di Giuda e sorbo montano.</p>					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	9,42	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	9,36	min	858	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,06	max	1067	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Acerò opalo	Frassino ossifillo	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	39	Classe di età	31 - 40
Densità	disforme	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	100 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1704
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	182	Incremento medio mc/ha	4,7
Diametro medio cm	17,0				
Note Piccoli tratti a prevalenza di acero opalo e frassino ossifillo. Latifoglie varie: cerro, roverella, acero trilobo, orniello, sorbo montano e maggiociondolo.					

NM1 A 11 / 2 Sotto Colle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	10,11	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	9,71	min	851	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,40	max	1060	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Orniello	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	60 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1573
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	162	Incremento medio mc/ha	3,4
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note Estese chiare con rocce ed arbusti spinosi. Latifoglie varie: cerro, acero opalo e trilobo, sorbo montano.</p>					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di roverella						
Superficie totale ha	9,71	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	9,54	min	762	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,17	max	967	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Roverella	Orniello	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	80 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	20 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	1288
Altezza dominante m	14,0	Provvigione mc/ha	135	Incremento medio mc/ha	2,9
Diametro medio cm	14,0				
Note Latifoglie varie: cerro, carpinella, acero trilobo. Alcune radure estese con elevata rocciosità affiorante, arbusti spinosi e ginestra.					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	9,90	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	9,74	min	955	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,16	max	1068	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Orniello	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	60 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	1325
Altezza dominante m	14,0	Provvigione mc/ha	136	Incremento medio mc/ha	2,9
Diametro medio cm	14,0				
<p>Note Numerose chiare con rocce, ginestra odorosa, arbusti spinosi, in cui la specie arborea più diffusa è l'orniello, si alternano a zone più dense e sviluppate con diffusione di roverella e carpino nero. Presenti acero trilobo e opalo, cerro, carpinella.</p>					

NM1 A 13 / 1 Colle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fustaia transitoria di cerro						
Superficie totale ha	14,18	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	14,08	min	1054	1)	Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,10	max	1132	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Fustaia transitoria	pura di	Cerro	Acero opalo	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	perciaia	Età prevalente anni:	54	Classe di età	51 - 60
Densità	normale	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	invecchiamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	a gruppi	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	al margine di una chiara	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	21,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	4224
Altezza dominante m	24,0	Provvigione mc/ha	300	Incremento medio mc/ha	5,6
Diametro medio cm	24,0				
<p>Note Nei tratti con esposizione nord-ovest prevale l'acero opalo con frassino ossifillo e carpino nero. In quelli più radi, esposti a sud, prevalente la roverella con orniello e acero trilobo. Latifoglie varie: carpinella, carpino bianco, acero campestre.</p>					

NM1 A 13 / 2 Colle Capannola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Pascoli

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	3,41	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità in particella			
produttiva ha	3,41	min	1101	1) Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1154	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Pascolo arborato con rocciosità elevata nella parte alta della particella. Le essenze arboree sono costituite da omiello, roverella, cerro ed acero trilobo. Arbusti spinosi localizzati nella parte inferiore (rosa, rovo e prunus). Cotico molto rado a bromo.</p>				

NM1 A 14 / 1 Costa Casciolo

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		
Emergenze	assenti		
			COMPRESA
			Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie					
Superficie totale ha	7,88	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	7,64	min	1043	1) Assente			
tare ha	0,24	max	1154	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	medio			

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Cerro	Acero opalo	Frassino ossifillo
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	44	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	17,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2292
Altezza dominante m	20,0	Provvigione mc/ha	300	Incremento medio mc/ha	6,8
Diametro medio cm	20,0				
<p>Note Ceppaie rade ma numerosi grossi polloni. Chiarie con rocce ed arbusti spinosi. Numerosi polloni i disseccati e sofferenti nella parte alta. Altre specie arboree presenti: roverella, orniello, acero trilobo e campestre, carpinella, carpino bianco, tiglio platifillo, ciavardello, farinaccio.</p>					

NM1 A 14 / 2 Costa Casciolo

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di roverella						
Superficie totale ha	6,80	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	6,63	min	980	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,17	max	1111	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Est	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Roverella	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	80 %	dim.1 <= 15 cm	30 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Carpino nero	20 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	70 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	11,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	663
Altezza dominante m	13,0	Provvigione mc/ha	100	Incremento medio mc/ha	2,2
Diametro medio cm	13,0				

Note Soprassuolo scadente per le frequenti radure. E' possibile un avviamento differibile e con lo scopo di favorire il pascolamento. Chiarie e zone rade lungo il margine settentrionale della uds.
 Tratto con prevalenza di cerro ed acero opalo vicino al fosso, a contatto con la uds 14/3.
 Presenza di ginepro.

NM1 A 14 / 3 Costa Casciolo

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di cerro						
Superficie totale ha	5,65	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	5,36	min	1003	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,29	max	1093	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Est	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Cerro	Carpino nero	Acero opalo	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	70 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 > 35 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	18,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1544
Altezza dominante m	21,0	Provvigione mc/ha	288	Incremento medio mc/ha	6,4
Diametro medio cm	21,0				

Note Alcune chiarie ampie pascolate ed invase da arbusti spinosi. Nei tratti radi e rocciosi compaiono roverella ed orniello; negli avvallamenti il carpino bianco. Latifoglie varie: frassino ossifilo, acero campestre, nocciolo, ciavardello e sorbo montano.

NM1 A 15 / 1 Sopra S.Salvatore

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/Corese Maestro
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. storic	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		
Emergenze	assenti		
			COMPRESA
			Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.		Fust.transitoria di roverella					
Superficie totale ha	11,73	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	11,66	min	653	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,07	max	820	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità	facile			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Fustaia transitoria	a prevalenza di	Roverella	Orniello	Carpino nero	Acero opalo
Grado evolutivo	pertaia	Età prevalente anni:	41	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente	distribuzione			
stato vegetativo		posizione			
Danni	Assenti	entità			
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1924
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	165	Incremento medio mc/ha	4,0
Diametro medio cm	16,0				
<p>Note Soprassuolo rado e discontinuo in prossimità del pascolo e nei tratti rocciosi. E' pascolato e recintato. Sono presenti numerose piante singole (circa 1000 piante ad ettaro). La parte superiore dell'Uds, oltre i 740 m. è avviata all'alto fusto da tempo. Latifoglie varie: acero trilobo, cerro, carpina. In prossimità del fontanile Ciampani abbondanti arbusti: ginestra, ginepro coccolone, rosa canina.</p>					

NM1 A 15 / 2 Sopra S.Salvatore

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/Corese Maestro
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Usa del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto						
Superficie totale ha	0,45	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità				
produttiva ha	0,45	min	712	1) Assente	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	762	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità	facile			
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Gruppi di alberi radi rappresentati principalmente da roverella. Tuttavia la superficie coperta da sole specie erbacee risulta esigua. Dove presente, questa è costituita da un cotico composto da bromo, erba mazzolina, loietto e coda di cane.</p>				

NM1 A 15 / 3 Fontanile Monte Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/Corese Maestro
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. stor. Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	0,48	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità			
produttiva ha	0,48	min	810	1) Assente tracciati n.			
tare ha	0,00	max	825	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Ovest	3)			
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità facile			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità medio			
Pascolamento	permanente	di specie diverse					

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Caratteristici filari di roverella un tempo utilizzati come confine tra i coltivi. Presenti anche alberature di ornio e acero campestre. Cotico a bromo, erba mazzolina, loietto, coda di cane. Rare leguminose e composite, presenza di cirsium e altre spinescenti.</p>				

NM1 A 16 / 1 Colle Moreante

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civici
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invec.cerro e roverella		Viabilità				
Superficie totale ha	13,23	Altitudine	tra 600 e 1000 m	1) Assente	tracciati n.			
produttiva ha	13,15	min	638	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
tare ha	0,08	max	826	3)				
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	captabilità	facile			
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	G. infiammabilità	elevato			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato					
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Cerro	Carpino nero	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	80 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Cerro	40 %	dim.2 > 35 cm	20 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente			distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	3261
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	248	Incremento medio mc/ha	5,3
Diametro medio cm	17,0				

Note Numerose chiarie con ginestra ed arbusti spinosi. Elevato pascolamento. Altre specie presenti: carpinella, acero opalo, trilobo e campestre.

NM1 A 16 / 2 Colle Moreante

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civici
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	imposto		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di roverella						
Superficie totale ha	6,19	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	6,19	min	638	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	767	2) Sentiero/mulat.	<table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Est	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Roverella	Carpino nero	Orniello	Cerro
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	70 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	80 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 > 35 cm	20 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente		distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1164
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	188	Incremento medio mc/ha	4,2
Diametro medio cm	16,0				
<p>Note Numerose chiarie nella parte centrale dell'Uds, con rocce ed arbusti (ginestra, biancospino, rovo, pruno e ginepro). Elevata accidentalità (rocce affioranti, elevata pendenza). Sovraccarico di pascolo. Latifoglie varie: acero opalo, albero di Giuda, maggiociondolo.</p>					

NM1 A 16 / 3 Colle Moreante

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	1,71	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità			
produttiva ha	1,70	min	807	1) Assente tracciati n.			
tare ha	0,01	max	827	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 5 e 15%	Esposizione	Nord-Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Cotico molto rado a bromo, erba mazzolina, coda di cane, e loietto; nei tratti peggiori Brachipodio e carici. Densi nuclei di arbusti nella parte inferiore dell'Uds. Piante arboree isolate, rappresentate principalmente da roverella, cerro e acero campestre. Cotico intensivamente pascolato e sottoposto a forte carico animale.</p>				

NM1 A 16 / 4 Colle Moreante

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civico
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fustaia transitoria di carpino				
Superficie totale ha	3,93	Altitudine	tra 600 e 1000 m			
produttiva ha	3,90	min	750			
tare ha	0,03	max	826			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Est			
Risorse idriche	assenti	origine				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse			
		Viabilità				
		1) Assente	tracciati n.			
		2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
		3)				
		captabilità				
		G. infiammabilità	elevato			

Fustaia transitoria	a prevalenza di	Carpino nero	Roverella	Acero opalo	Orniello
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:		Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente			distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	780
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	200	Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm	16,0				
Note					

NM1 A 16 / 5 Colle Moreante

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto						
Superficie totale ha	2,07	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità				
produttiva ha	2,05	min	761	1) Assente	tracciati n.			
tare ha	0,02	max	811	2)	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Est	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note Arbusteto a rovo, rosa, pruno.				

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie				
Superficie totale ha	2,44	Altitudine	tra 600 e 1000 m			
produttiva ha	2,44	min	718			
tare ha	0,00	max	794			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Est			
Risorse idriche	assenti	origine				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse			
			Viabilità			
			1) Assente			
			2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
			3) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
			tracciati n.			
			captabilità			
			G. infiammabilità medio			

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	80 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 > 35 cm	20 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	503
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	206	Incremento medio mc/ha	4,6
Diametro medio cm	16,0				
Note		Molto accidentata. Latifoglie varie: cerro, acero opalo, carpinella, maggiociondolo.		Lungo il margine superiore alcune chiarie con ginestra ed arbusti spinosi.	

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	8,58	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	8,58	min	704	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	900	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	70 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1716
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	200	Incremento medio mc/ha	4,3
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note In corrispondenza di affioramenti rocciosi chiarie con ginestra ed arbusti spinosi, circondate da tratti di ceduo rado a prevalenza di orniello con roverella (altezze contenute). Tratti più densi e fertili con cerro acero opalo e carpinella.</p>					

NM1 A 17 / 3 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino						
Superficie totale ha	8,76	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	8,76	min	698	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	920	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Orniello	Cerro	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	47	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	70 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2269
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	259	Incremento medio mc/ha	5,5
Diametro medio cm	16,0				
<p>Note Alcuni tratti a prevalenza di frassino ossifillo e acero opalo, in corrispondenza degli avvallamenti. Latifoglie varie: carpinella, nocciolo, farinaccio, fusaggine.</p>					

NM1 A 18 / 1 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	17,21	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	17,10	min	848	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,11	max	1070	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Roverella	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	50 %	dim.1 <= 15 cm	50 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	50 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	11,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2822
Altezza dominante m	13,0	Provvigione mc/ha	165	Incremento medio mc/ha	3,7
Diametro medio cm	13,0				
<p>Note Numerose chiarie con rocce, ginepro ed arbusti spinosi. Tratti più fertili e densi con presenza di cerro e acero opalo.</p>					

NM1 A 18 / 2 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	rifugio		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	17,37	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	16,87	min	942	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,50	max	1085	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Orniello	Carpino nero	Roverella	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,85	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	scarsa	sp.1 Roverella	50 %	dim.1 <= 15 cm	70 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	30 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	9,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	1940
Altezza dominante m	12,0	Provvigione mc/ha	115	Incremento medio mc/ha	2,7
Diametro medio cm	12,0				
<p>Note Condizioni stazionali sfavorevoli a causa della superficialità del suolo. Sviluppo scarso e portamento i mediocre.</p> <p>Alcuni tratti più freschi con presenza di cerro e acero opalo vicino ai margini inferiore ed orientale.</p> <p>Altre specie presenti: acero trilobo, farinaccio. Fra gli arbusti: rosa canina, biancospino, ginepro. Presente un rifugio in mediocri condizioni di conservazione (tetto parzialmente privo di tegole, interno in degrado). Cubatura circa 40 m.</p>					

NM1 A 18 / 3 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Pascoli

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto					
Superficie totale ha	0,88	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	0,88	min	1081	1) Assente			
tare ha	0,00	max	1088	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 5 e 15%	Esposizione	Sud-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	medio			

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note Pascolo arborato costituito da roverella, cerro e acero campestre. Rocciosità elevata lungo il crinale. Cotico a bromus sp. Trattti peggiori con Brachipodio e carice				

NM1 A 19 / 1 Colle Linzoli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	grotta		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino					
Superficie totale ha	13,68	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità in particella			
produttiva ha	13,58	min	912	1) Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,10	max	1081	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età 41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	70 %	dim.1 <= 15 cm 30 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 tra 15 e 35 cm 70 %
				dim.3
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione	
stato vegetativo			posizione	
Danni	Assenti		entità	
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc 3056
Altezza dominante m	18,0	Provvigione mc/ha	225	Incremento medio mc/ha 5,0
Diametro medio cm	18,0			
Note Negli avvallamenti tratti a prevalenza di acero opalo, frassino ossifillo e cerro. Forte selezione sui polloni di carpino. Latifoglie varie: roverella, carpinella, maggiociondolo, agrifoglio.				

NM1 A 19 / 2 Colle Linzoli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	grotta		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino		Viabilità in particella				
Superficie totale ha	8,39	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
produttiva ha	8,33	min	994	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
tare ha	0,06	max	1083	3)				
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord	captabilità				
Risorse idriche	assenti	origine		G. infiammabilità	medio			
Fertilità	media	Rischio incendio	medio					
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Acerò opalo	Cerro	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	40 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	60 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3 > 35 cm	10 %
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1808
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	217	Incremento medio mc/ha	5,2
Diametro medio cm	17,0				
Note Numerosi tratti con prevalenza di acero opalo e frassino. Grotta a quota m. 1040. Latifoglie varie: carpinella, orniello, roverella.					

NM1 A 20 / 1 Colle Linzoli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di cerro						
Superficie totale ha	5,09	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	5,09	min	998	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1094	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Cerro	Carpino nero	Acero opalo	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	90 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	10 %	dim.2 <= 15 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1400
Altezza dominante m	18,0	Provvigione mc/ha	275	Incremento medio mc/ha	6,1
Diametro medio cm	18,0				

Note Nella parte superiore dell'Uds ampie zone di pascolo arborato e cespugliato. Subito sotto fascia di bosco rado con prevalenza di acero opalo e frassino ossifillo. Matricine di grandi dimensioni di cerro e frassino.
Latifoglie varie: carpinella, orniello.

NM1 A 20 / 2 Colle Linzoli

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	8,14	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	7,33	min	1005	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,81	max	1089	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Cerro	Orniello	Acero opalo
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	50 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3 > 35 cm	10 %
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	13,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1466
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	200	Incremento medio mc/ha	4,4
Diametro medio cm	16,0				
<p>Note Chiarie e zone più rade nella porzione centrale dell'Uds. Altre specie presenti: frassino ossifilo, tiglio platifilo, acero trilobo, nocciolo.</p>					

NM1 A 21 / 1 Valle del Fontanile

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Ab R.integrale	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di cerro						
Superficie totale ha	8,07	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	7,50	min	980	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,57	max	1089	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Cerro	Carpino nero	Acero opalo	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,85	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	70 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 > 35 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1463
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	195	Incremento medio mc/ha	4,3
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note Chiarie rocciose pascolate con arbusti spinosi. Latifoglie varie: roverella ed ornello nei tratti più esposti e rocciosi, carpino bianco negli avvallamenti. Presenti anche: frassino ossifilo, acero campestre, ciavardello, nocciolo, farinaccio.</p>					

NM1 A 21 / 2 Costa Casciolo

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di roverella						
Superficie totale ha	4,64	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	3,25	min	967	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	1,39	max	1085	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Est	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Roverella	Orniello	Carpino nero	Cerro
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	44	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,85	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Roverella	80 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	20 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	455
Altezza dominante m	14,0	Provvigione mc/ha	140	Incremento medio mc/ha	3,2
Diametro medio cm	14,0				
<p>Note Tratti radi e chiarie lungo il margine settentrionale; pascolo arborato a quota m.1050. Altre specie presenti: acero trilobo, farinaccio. Fra gli arbusti: ginepro coccolone, biancospino, pungitopo, corniolo.</p>					

NM1 A 21 / 3 Valle del fontanile

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino					
Superficie totale ha	1,33	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	1,32	min	1010	1) Assente			
tare ha	0,01	max	1079	2) <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 15px;"></td> <td style="width: 15px;"></td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> </table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	elevato			

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Cerro	Roverella	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	44	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	40 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Roverella	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	284
Altezza dominante m	18,0	Provvigione mc/ha	215	Incremento medio mc/ha	4,9
Diametro medio cm	18,0				
<p>Note Trattati radi a prevalenza di roverella ed orniello. Altre specie presenti: acero opalo, trilobo e campestre, frassino ossifilo, tiglio platifilo, ciavardello, i farinaccio, maggiociondolo, carpino bianco, pungitopo, agrifoglio.</p>					

NM1 A 21 / 4 Costa Casciolo

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Farfa
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	1,28	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	1,25	min	1050	1) Assente tracciati n.			
tare ha	0,03	max	1088	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità scarso			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note				

NM1 A 22 / 1 Fontanile Monte Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic	Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	abbeveratoio	imposto	COMPRESA
Emergenze	assenti		
			Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Formazione pioniera	Bosco di neoformazione	
Superficie totale ha	5,03	Altitudine	tra 600 e 1000 m
produttiva ha	5,03	min	689
tare ha	0,00	max	825
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato
Pascolamento	permanente	di specie diverse	

Viabilità		in particella			
1)	Camionabile	tracciati n.			
2)	Pista d'esbosco	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	1		
1					
3)	Sentiero/mulat.				

captabilità	facile
G. infiammabilità	elevato

Bosco di invasione	misto di	Roverella	Acero campestre	Orniello	Carpino nero
Grado evolutivo		Età prevalente anni:		Classe di età	Indeterm.
Densità	scarsa	Coeff. copertura	0,60	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente	distribuzione			
stato vegetativo		posizione			
Danni	Assenti	entità			
Altezza media m	10,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	402
Altezza dominante m	13,0	Provvigione mc/ha	80	Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm	13,0				

Note Pianta arboree distribuite in modo piuttosto uniforme; arbusti più densi in prossimità del crinale. Cotico molto rado a bromo, erba mazzolina, coda di cane e loglio. Presenti anche brachipodio e carici.
La zona bassa presenta altezze minori (6-10 metri). Forte pressione del carico di bestiame. E' presente una struttura in paleria per il raggruppamento del bestiame presso il fontanile.

NM1 A 22 / 2 Fontanile Monte Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civici
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fust.transitoria di roverella	
Superficie totale ha	9,22	Altitudine	tra 600 e 1000 m
produttiva ha	9,13	min	694
tare ha	0,09	max	811
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato
Pascolamento	permanente		di specie diverse

Viabilità		in particella			
1)	Camionabile	tracciati n.			
2)	Sentiero/mulat.	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	1		
1					
3)					

captabilità		facile
G. infiammabilità		elevato

Fustaia transitoria	a prevalenza di	Roverella	Orniello	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	41	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente			distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1643
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	180	Incremento medio mc/ha	4,4
Diametro medio cm	15,0				

Note Avviato all'alto fusto oltre i 740 m di quota.
Soprasuolo rado e cespugliato lungo la strada forestale, al margine meridionale della uds.
Latifoglie varie: acero trilobo e opalo, cerro, carpinella.

NM1 A 22 / 3 Colle delle Mura

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paes. stor. Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	storica		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fust.transitoria di roverella						
Superficie totale ha	13,21	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	13,09	min	760	1) Camionabile	tracciati n.			
tare ha	0,12	max	931	2) Sentiero/mulat.	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	1		
1								
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità	facile			
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Fustaia transitoria	a prevalenza di	Roverella	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	perciaia	Età prevalente anni:	41	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	Assente			distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	9,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	1833
Altezza dominante m	12,0	Provvigione mc/ha	140	Incremento medio mc/ha	3,4
Diametro medio cm	12,0				

Note La zona a monte della strada, fino a quota 800 m è stata avviata all'alto fusto. La densità si riduce in prossimità del crinale. Chiarie con arbusti spinosi.
Latifoglie varie: acero trilobo e opalo, cerro, carpinella, ciavardello.

NM1 A 22 / 4 Fontanile Monte Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto		Viabilità in particella				
Superficie totale ha	1,88	Altitudine	tra 600 e 1000 m	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
produttiva ha	1,85	min	700	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
tare ha	0,03	max	746	3)				
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	captabilità				
Risorse idriche	assenti	origine		G. infiammabilità	elevato			
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato					
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Arbusteto a prevalenza di ginestra odorosa con rosa canina, rovo e ginepro coccolone. Presenti nuclei e piante sparse di roverella, orniello, carpino nero. Residue piante di colture agrarie abbandonate: acero trilobo, vite, olivo, fico.</p>				

NM1 A 22 / 5 Fontanile Monte Pendente

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Altre superfici	

Uso del suolo	Coltivaz. arbor.special.	Oliveto in coltura specializzata						
Superficie totale ha	0,76	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità in particella				
produttiva ha	0,76	min	680	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	705	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	scarso			
Pascolamento		di						

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note				

NM1 A 23 / 1 Colle delle Mura

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona De1 Tutela paesis. storic	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	Usi civici
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	storica	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino						
Superficie totale ha	10,01	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	9,89	min	771	1) Pista d'esbosco	tracciati n.			
tare ha	0,12	max	932	2) Sentiero/mulat.	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Est	3)				
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità	facile			
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Acero opalo	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	50 %
				dim.3 > 35 cm	30 %
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1978
Altezza dominante m	20,0	Provvigione mc/ha	200	Incremento medio mc/ha	4,8
Diametro medio cm	20,0				

Note Acero opalo più frequente e di migliore sviluppo negli avvallamenti. Presenza di chiarie pascolate.
Latifoglie varie: roverella, cerro, acero trilobo e campestre, nocciolo, agrifoglio, ciavardello.

NM1 A 24 / 1 Valle della Macchia

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	12,31	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	12,31	min	751	1)	Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,00	max	999	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Roverella	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	50 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Roverella	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3 > 35 cm	10 %
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2216
Altezza dominante m	14,0	Provvigione mc/ha	180	Incremento medio mc/ha	4,3
Diametro medio cm	14,0				
<p>Note Numerose aree rade rocciose ed arbustate con nuclei di orniello e roverella (sviluppo ridotto). Latifoglie varie: acero opalo, trilobo e campestre, cerro, maggiociondolo, agrifoglio.</p>					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino						
Superficie totale ha	18,25	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	18,13	min	859	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,12	max	1101	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Cerro	Acero opalo	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	60 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3 > 35 cm	10 %
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	4261
Altezza dominante m	20,0	Provvigione mc/ha	235	Incremento medio mc/ha	5,2
Diametro medio cm	20,0				

Note Negli avvallamenti tratti a prevalenza di acero opalo con cerro e frassino, di buono sviluppo e portamento. Presenza di chiarie. Latifoglie varie: ornio, acero trilobo e campestre, carpinella, agrifoglio, maggiociondolo.

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	storica	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	0,92	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	0,92	min	1049	1) Assente tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1091	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note Trattti di bosco aperto con copertura arbustiva elevata.				

NM1 A 25 / 1 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino		Viabilità in particella				
Superficie totale ha	9,18	Altitudine	tra 600 e 1000 m	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
produttiva ha	9,18	min	752	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
tare ha	0,00	max	998	3)				
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord	captabilità				
Risorse idriche	assenti	origine		G. infiammabilità	medio			
Fertilità	media	Rischio incendio	medio					
Pascolamento	sporadico	di specie diverse						

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Roverella	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	60 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1836
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	200	Incremento medio mc/ha	4,8
Diametro medio cm	16,0				

Note Pietrosità e rocciosità molto elevate. A valle del sentiero matricine di frassino e tiglio di grandi dimensioni. Latifoglie varie: cerro, acero trilobo e opalo, tiglio platifilo, frassino ossifillo, carpino bianco, nocciolo. Scarso sottobosco.

NM1 A 25 / 2 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino		Viabilità in particella				
Superficie totale ha	13,96	Altitudine	tra 600 e 1000 m	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
produttiva ha	13,78	min	880	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
tare ha	0,18	max	1067	3)				
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord	captabilità				
Risorse idriche	assenti	origine		G. infiammabilità	medio			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	medio					
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Acero opalo	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,95	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	70 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	3101
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	225	Incremento medio mc/ha	5,4
Diametro medio cm	17,0				
<p>Note Nei tratti con suolo più fresco e profondo prevalenza di acero opalo, frassino ossifillo e cerro. Lungo il sentiero principale matricine di faggio e tiglio (capitozzato) di grandi dimensioni. Zone a pascolo arborato in prossimità del crinale. Latifoglie varie: tiglio nostrale, frassino maggiore, acero trilobo, nocciolo. Circa 2500 piante ad ettaro.</p>					

NM1 A 26 / 1 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino						
Superficie totale ha	13,69	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	13,69	min	936	1)	Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1085	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Est	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Acero opalo	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	80 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	20 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	15,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2738
Altezza dominante m	18,0	Provvigione mc/ha	200	Incremento medio mc/ha	4,8
Diametro medio cm	18,0				
<p>Note Negli avvallamenti tratti a prevalenza di acero opalo, frassino e cerro. Rilevante presenza di faggio lungo il sentiero, nella parte orientale della uds. Matricine di grandi dimensioni lungo il sentiero. Latifoglie varie: acero campestre, orniello, tiglio nostrano, nocciolo.</p>					

NM1 A 26 / 2 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie					
Superficie totale ha	4,21	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	4,21	min	965	1) Assente tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1063	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Nord-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Ceduo matricinato	misto di	Cerro	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età 41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	1,00	Avviamento a fustaia
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	70 %	dim.1 tra 15 e 35 cm 80 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 > 35 cm 20 %
				dim.3
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione
stato vegetativo				posizione
Danni	Assenti			entità
Altezza media m	17,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc 1010
Altezza dominante m	20,0	Provvigione mc/ha	240	Incremento medio mc/ha 5,7
Diametro medio cm	20,0			

Note Latifoglie varie: acero trilobo, opalo e campestre, roverella, tiglio nostrano, frassino ossifillo, nocciolo, agrifoglio, carpinella.

NM1 A 27 / 1 Valle Sottacera

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino						
Superficie totale ha	16,74	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	16,27	min	947	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,47	max	1112	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	a prevalenza di	Carpino nero	Orniello	Roverella	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,95	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	60 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	80 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	11,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	2278
Altezza dominante m	17,0	Provvigione mc/ha	140	Incremento medio mc/ha	3,3
Diametro medio cm	17,0				
<p>Note Nei tratti a suolo profondo e fresco prevalenza di cerro ed acero opalo. Presenti chiarie rocciose arbustate e pascolate. Arbusti: pruno, rosa, rovo, basso nocciolo e corniolo, raro ginepro comune Latifoglie varie: acero trilobo, farinaccio, cerro, caero campestre, acero minore, acero opalo, maggiociondolo. .</p>					

NM1 A 28 / 1 Colle Laffarina

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Bb R.orientata 2°livello Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	0,51	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	0,51	min	1088	1) Assente			
tare ha	0,00	max	1095	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 5 e 15%	Esposizione	Nord-Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	elevato			

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Nella parte nord-occidentale ed in prossimità della cima nuclei densi di arbusti. Tratti di bosco aperto. Cotico a bromo, erba mazzolina, codolina e paleino odoroso.</p>				

NM1 A 28 / 2 Colle Laffarina

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Bb R.orientata 2°livello	Usi civici	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie					
Superficie totale ha	6,02	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	5,90	min	1062	1) Assente			
tare ha	0,12	max	1101	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Est	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	elevato			

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Acero opalo	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	40	Classe di età	31 - 40
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	80 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	20 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	991
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	168	Incremento medio mc/ha	4,2
Diametro medio cm	16,0				
Note Nuclei a prevalenza di cerro con acero opalo. Gruppi di ceppaie e matricine di faggio nella parte orientale dell'Uds. Latifoglie varie: orniello, acero trilobo e campestre, maggiociondolo.					

NM1 A 28 / 3 Colle Laffarina

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese/V.Capretta/Capre
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Bb R.orientata 2°livello	Usi civici	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Fust.trans. e cedui da avviare	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	12,06	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità in particella				
produttiva ha	10,99	min	1012	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	1,07	max	1113	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Nord-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	scarso	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	misto di		Cerro	Carpino nero	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50	
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia		
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	70 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	80 %	
Matr. distribuzione	uniforme	sp.2 Latifoglie varie	30 %	dim.2 > 35 cm	20 %	
				dim.3		
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione		
stato vegetativo				posizione		
Danni	Assenti			entità		
Altezza media m	17,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2660	
Altezza dominante m	19,0	Provvigione mc/ha	242	Incremento medio mc/ha	5,8	
Diametro medio cm	19,0					
<p>Note Presenza di chiarie rocciose con cotico erboso e cespugli spinosi. Prevalenza di acero opalo e frassino i ossifillo nei tratti a suolo fresco e profondo. Latifoglie varie: acero trilobo e campestre, tiglio nostrano, roverella, nocciolo, agrifoglio.</p>						

NM1 A 29 / 1 Valle Magenola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	abbeveratoio	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo cespugliato				
Superficie totale ha	0,52	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità			
produttiva ha	0,52	min	769	1) Assente tracciati n.			
tare ha	0,00	max	790	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	elevata	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse				

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note Pascolo cespugliato. Esigua superficie di festuceto con eringio e cardi. Zone invase da rovi e prunus.				

NM1 A 29 / 2 Valle Magenola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Arbusteto o cespuglieto	Arbusteto		Viabilità				
Superficie totale ha	2,43	Altitudine	tra 600 e 1000 m	1) Assente tracciati n.				
produttiva ha	2,41	min	640	2) <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				
tare ha	0,02	max	799	3)				
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	captabilità				
Risorse idriche	assenti	origine		G. infiammabilità	elevato			
Fertilità	scarsa	Rischio incendio	elevato					
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
<p>Note Includi tratti di pascolo arborato con roverella, orniello, carpinella, carpino nero. Fitto corteggio arbustivo di rosa, rovi, prugnoli, ginestra odorosa. Residue piante in sesto di colture abbandonate: acero trilobo con vite, olivo, fico, ciliegio.</p>				

NM1 A 29 / 3 Valle Magenola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fust.trans. cerro e roverella						
Superficie totale ha	16,84	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	16,75	min	576	1) Camionabile	tracciati n.			
tare ha	0,09	max	795	2) Sentiero/mulat.	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	1		
1								
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Fustaia transitoria	mista di	Roverella	Cerro	Orniello	Latifoglie varie
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	49	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,85	Avviamento a fustaia	taglio di avviamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	casuale	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	sotto copertura	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	4188
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	250	Incremento medio mc/ha	5,1
Diametro medio cm	16,0				

Note Il soprassuolo si presenta molto rado a nord-ovest. Tratti densi a est. Latifoglie varie: acero trilobo e campestre, carpino nero. Presenza di carpinella allo stato arbustivo a causa delle ripetute brucature da parte del bestiame.

NM1 A 29 / 4 Valle Magenola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invec.cerro e roverella						
Superficie totale ha	13,59	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	13,59	min	657	1)	Sentiero/mulat. tracciati n.			
tare ha	0,00	max	947	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Cerro	Roverella	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	41	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	50 %	dim.1 tra 15 e 35 cm	90 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 > 35 cm	10 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	14,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	2446
Altezza dominante m	16,0	Provvigione mc/ha	180	Incremento medio mc/ha	4,4
Diametro medio cm	16,0				
<p>Note I tratti rocciosi, nella parte orientale dell'Uds, sono occupati da leccio, terebinto ed omiello. Solo la zona i nord-ovest si presenta densa e sviluppata (circa 2500 piante ad ettaro). Latifoglie varie: acero trilobo, opalo e campestre.</p>					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	7,93	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	7,71	min	756	1) Camionabile	tracciati n.			
tare ha	0,22	max	918	2) Sentiero/mulat.	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	1		
1								
Cl. pendenza	tra 50 e 80%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Cerro	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Cerro	50 %	dim.1 <= 15 cm	20 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	50 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	50 %
				dim.3 > 35 cm	30 %
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	12,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1866
Altezza dominante m	15,0	Provvigione mc/ha	242	Incremento medio mc/ha	5,8
Diametro medio cm	15,0				
<p>Note L'area attorno a Colle delle Mura, su suolo superficiale e roccioso, presenta un soprassuolo di ornello e roverella con sviluppo stentato e scarsa densità. Nei dintorni del fosso zone a prevalenza di cerro ed acero opalo. Avviata all'alto fusto una fascia compresa tra il margine inferiore e quota 800 m.</p>					

NM1 A 30 / 2 Sotto Colle Lepre

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Fust.trans. e cedui da avviare

Uso del suolo	Bosco altof. di latifog.	Fustaia transitoria di cerro						
Superficie totale ha	3,46	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	3,46	min	894	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	946	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Fustaia transitoria	a prevalenza di	Cerro	Roverella	Carpino nero	Latifoglie varie
Grado evolutivo	perticaia	Età prevalente anni:	54	Classe di età	51 - 60
Densità	normale	Coeff. copertura	0,95	Avviamento a fustaia	invecchiamento
Matricinatura (cedui) entità		sp.1	0 %	dim.1	0 %
Matr. distribuzione		sp.2	0 %	dim.2	
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	con specie autoctone		distribuzione	a gruppi	
stato vegetativo	scadente (aduggiato)		posizione	sotto copertura	
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	18,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1003
Altezza dominante m	21,0	Provvigione mc/ha	290	Incremento medio mc/ha	5,4
Diametro medio cm	21,0				
<p>Note Alcuni tratti con aspetto di fustaia adulta, rada. Circa i 2500 piante ad ettaro, pascolato. Latifoglie varie: acero opalo e trilobo, orniello.</p>					

NM1 A 30 / 3 Sotto Colle Lepre

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		COMPRESA
Emergenze	assenti		Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecchiato di carpino						
Superficie totale ha	8,38	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità	in particella			
produttiva ha	8,29	min	918	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,09	max	1085	2)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud-Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	elevata	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	medio			
Pascolamento	permanente		di specie diverse					

Ceduo matricinato	puro di	Carpino nero	Orniello	Roverella	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	45	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Carpino nero	60 %	dim.1 <= 15 cm	80 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Roverella	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	20 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	10,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1534
Altezza dominante m	12,0	Provvigione mc/ha	185	Incremento medio mc/ha	4,1
Diametro medio cm	12,0				
<p>Note Latifoglie varie: acero trilobo, leccio, maggiociondolo. Nella parte alta dell'impluvio tratti a prevalenza di acero opalo con cerro e frassino ossifillo. Chiarie in corrispondenza di affioramenti rocciosi, con cotico rado, nuclei di arbusti spinosi e specie arboree (roverella, orniello).</p>					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Bb R.orientata 2°livello Uso civico		
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti	COMPRESA	
Emergenze	assenti	Pascoli	

Uso del suolo	Pascolo-prato pascolo		Pascolo arborato				
Superficie totale ha	1,25	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità			
produttiva ha	1,25	min	1062	1) Assente			
tare ha	0,00	max	1096	2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Sud-Ovest	3)			
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità			
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità			
Pascolamento	permanente		di specie diverse	elevato			

Grado evolutivo	Età prevalente anni:		Classe di età	
Densità	Coeff. copertura		Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	sp.1	%	dim.1	%
Matr. distribuzione	sp.2	%	dim.2	
			dim.3	
Rinnovazione (fustaia)	distribuzione			
stato vegetativo	posizione			
Danni	entità			
Altezza media m	Classe provvigione		Volume totale mc	
Altezza dominante m	Provvigione mc/ha		Incremento medio mc/ha	
Diametro medio cm				
Note Arbusti prevalenti nella parte esposta a sud-ovest e vicino alla vetta. Tratti di bosco aperto.				

NM1 A 31 / 2 Valle Magenola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Bb R.orientata 2°livello	Usi civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		
Emergenze	assenti		
			COMPRESA
			Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	8,62	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità in particella				
produttiva ha	8,62	min	941	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,00	max	1102	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 15 e 30%	Esposizione	Ovest	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Orniello	Latifoglie varie	
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	disforme	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	scarsa	sp.1 Carpino nero	40 %	dim.1 <= 15 cm	30 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	60 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	70 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	11,0	Classe provvigione	151 - 300 mc /ha	Volume totale mc	1336
Altezza dominante m	13,0	Provvigione mc/ha	155	Incremento medio mc/ha	3,7
Diametro medio cm	13,0				
<p>Note Tratto di pascolo arborato e cespugliato nella parte alta dell'Uds. Lungo il fosso principale piccoli tratti a miglior sviluppo a prevalenza di acero opalo e frassino. Altre specie arboree presenti: cerro, leccio, acero trilobo.</p>					

NM1 A 31 / 3 Valle Magenola

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tev/Corese/C.Maestro/Magenola
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Bb R.orientata 2°livello	Usi civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	assenti		
Emergenze	assenti		
			COMPRESA
			Boschi in evoluzione naturale

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie						
Superficie totale ha	17,62	Altitudine	tra 1000 e 1400 m	Viabilità in particella				
produttiva ha	16,94	min	848	1) Sentiero/mulat.	tracciati n.			
tare ha	0,68	max	1091	2)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Cl. pendenza	tra 30 e 50%	Esposizione	Sud	3)				
Risorse idriche	assenti	origine		captabilità				
Fertilità	media	Rischio incendio	medio	G. infiammabilità	elevato			
Pascolamento	permanente	di specie diverse						

Ceduo matricinato	misto di	Leccio	Roverella	Carpino nero	Orniello
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	42	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,90	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	scarsa	sp.1 Leccio	60 %	dim.1 <= 15 cm	10 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Latifoglie varie	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	90 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)			distribuzione		
stato vegetativo			posizione		
Danni	Assenti		entità		
Altezza media m	10,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	2541
Altezza dominante m	12,0	Provvigione mc/ha	150	Incremento medio mc/ha	3,6
Diametro medio cm	12,0				
<p>Note Stazione piuttosto arida su suolo superficiale e roccioso. La parte a nord-orientale, vicino a Colle Iaffarina, è più rada e a prevalenza di roverella. Altre specie presenti: cerro, acero trilobo e opalo, terebinto ginepro comune.</p>					

Comune	Scandriglia	Sottobacino idrografico	Tevere/Corese
Proprietà	Demanio Regione Lazio	Ente gestore	Regione Lazio
Vincoli	Zona Cb Tutela e gestione fore Uso civico	Paesag.(L.N.431/85-solo boschi	
Istituzioni	Parco Reg. Monti Lucretili		
Concessioni	assenti		
Infrastrutture	Edificio	COMPRESA	
Emergenze	storica	Boschi in evoluzione naturale	

Uso del suolo	Bosco ceduo	Ceduo invecch. di latifoglie			
Superficie totale ha	1,03	Altitudine	tra 600 e 1000 m	Viabilità	in particella
produttiva ha	1,03	min	662	1) Strada forest.	tracciati n.
tare ha	0,00	max	736	2) Pista d'esbosco	5
Cl. pendenza	magg.dell'80%	Esposizione	Nord-Ovest	3)	
Risorse idriche	disponibili in	origine	acquedotto	captabilità	facile
Fertilità	media	Rischio incendio	elevato	G. infiammabilità	medio
Pascolamento	sporadico		di bovini		

Ceduo matricinato	misto di	Carpino nero	Leccio	Roverella	Latifoglie varie
Grado evolutivo	invecchiato	Età prevalente anni:	46	Classe di età	41 - 50
Densità	normale	Coeff. copertura	0,80	Avviamento a fustaia	
Matricinatura (cedui) entità	normale	sp.1 Latifoglie varie	60 %	dim.1 <= 15 cm	60 %
Matr. distribuzione	irregolare	sp.2 Carpino nero	40 %	dim.2 tra 15 e 35 cm	40 %
				dim.3	
Rinnovazione (fustaia)				distribuzione	
stato vegetativo				posizione	
Danni	Assenti			entità	
Altezza media m	10,0	Classe provvigione	51 - 150 mc /ha	Volume totale mc	149
Altezza dominante m	13,0	Provvigione mc/ha	145	Incremento medio mc/ha	3,2
Diametro medio cm	13,0				
Note					